

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة

**المركز الوطني للوقاية من الأمراض
السارية والمتوطنة ومكافحتها**

والهيئة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي



لقاح إنفلونزا

A\H1N1



ولمزيد من الاستفسار الاتصال على الأرقام التالية
0214815980 - 0217153312

أ الخط المباشر على شبكة المدار الجديد
15566

أو على هواتف قسم الرصد والتقاضي
0514626163 - 0514626202
051514606022 داخلي 117 - 118

وموقع المركز على شبكة المعلومات الدولية
WWW.nidcc.org.ly

وموقع جائحة الإنفلونزا على شبكة المعلومات الدولية
www.avianflu.org.ly



مع تحية

المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها

الإدارة العامة للمركز - طرابلس ليبيا - 021 4803198 - 021 7153328 - 021 4803231

E-mail : info@nidcc.org.ly website: www.nidcc.org.ly

تصميم وتعليق مطبوع الاعلام

- تتشابه الآثار الجانبية للتطعيم باللقاح المعطل ضد فيروس
أنفلونزا A/H1N1 تلك المرتبطة بلقاح الأنفلونزا الموسمية
المعطل .

- اللقاح المعطل لأنفلونزا A/H1N1 (غير حي)
لذا لا يمكن للقاح أن يسبب الإصابة بالمرض .

7 - في حالة وجود تفاعل شديد ضد اللقاح

التوجه بالشخص إلى الطبيب على الفور للاستشارة الطبية .

8 - كيف أعرف المزيد ؟

- أطلب من جهة تقديم الخدمات الصحية الخاصة بك
تزويدك بالمعلومات .

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن لقاح
الأنفلونزا A/H1N1 وذلك بزيارة المواقع التالية :

منظمة الصحة العالمية WHO

المركز العالمي للأمراض CDC

www.who.net

www.cdc.gov

1 - ما المقصود بأنفلونزا A/H1N1 ؟

إنفلونزا A/H1N1 (والتي يطلق عليها أحيانا مصطلح إنفلونزا الخنازير) هو مرض تسببه سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا وقد تفتش هذا النوع من الأنفلونزا في العديد من دول العالم .
وكبقيّة فيروسات الإنفلونزا الأخرى تنتشر عدوى إنفلونزا A/H1N1 من شخص لآخر عن طريق السعال ، والعطس وأحيانا من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس .

تتضمن أعراض الإصابة بفيروس إنفلونزا A/H1N1 :-

أعراض أساسية (ارتفاع درجة الحرارة - سعال - التهاب الحلق)
علامات إضافية مصاحبة للأعراض الأساسية :

- قشعريرة
- إسهال
- حمى
- احمرار بالجلد
- شحوب بالوجه
- حكة بالجسم
- إعياء

2 - كيف تختلف إنفلونزا A/H1N1

عن الأنفلونزا العادية (الموسمية) ...

- تتغير الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية من موسم لآخر ، إلا أنها مرتبطة بشكل وثيق ببعضها البعض ، عند الإصابة بفيروسات الأنفلونزا الموسمية فإن الشخص يكتسب مناعة تحميه من الإصابة مرة أخرى بفيروسات الإنفلونزا الموسمية المنتشرة خلال نفس الموسم أما فيروس A/H1N1 فهو سلالة فيروسية جديدة وتختلف عن فيروسات الإنفلونزا الموسمية .

3 - لقاح إنفلونزا H1N1 ...

تتوفر العديد من اللقاحات المضادة للإنفلونزا H1N1 ، وتتشابه طريقة تصنيع هذه اللقاحات مع لقاحات الإنفلونزا الموسمية .

تتسم هذه اللقاحات بالمأمونية والفاعلية كما هو الحال بالنسبة للقاحات الإنفلونزا الموسمية .

ويمكن إعطاء اللقاح في نفس الوقت مع بقية اللقاحات الأخرى بما في ذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية .


غير أن هذه اللقاحات لن تمنع الإصابة بالأمراض الشبيهة للإنفلونزا (الفيروسات المسببة لنزلات البرد) .

كما توجد نوعية أخرى من لقاح إنفلونزا A/H1N1 تأخذ عن طريق الأنف .

4 - من المستهدف باللقاح ؟

يوصي المركز الوطني بأولوية منح لقاح أنفلونزا A/H1N1 لشرائح المجتمع وللضئات التالية :

- العاملين بقطاع الصحة، جهاز الأمن العام ، الشعب المسلح ، دور الإصلاح والتأهيل ، العاملين بالخدمات العامة والنظافة والبيئة .
- النساء الحوامل .
- الأمراض المزمنة وتتمثل في ((أمراض الجهاز التنفسي - أمراض السكري - أمراض الكبد - أمراض الكلى - الارتفاع الشديد في ضغط الدم - أمراض نقص المناعة وأمراض الدم والأورام - أمراض الشلل الدماغي والضغط العضلي - أمراض القلب)) .
- الأسر التي لها أطفال دون ستة أشهر من العمر .
- الأطفال من عمر ستة أشهر إلى خمس سنوات .
- الفئة العمرية من ست سنوات إلى أربعة وعشرون سنة .
- بقية فئات المجتمع .



5 - لا تأخذ اللقاح أو أجله في حالة :

- إذا كنت مصابا بالحساسية مثل الحساسية المفرطة للبيض أو أي حساسية أخرى .
- إذا سبق لك الإصابة بحساسية مفرطة بعد أخذ جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية .
- إذا سبق لك الإصابة بمتلازمة غيرن باريه (مرض شللي حاد) .
- إذا كنت تشعر باعتلال مرضي طفيف أو شديد فقد تنصح بالانتظار لحين التماثل للشفاء قبل الحصول على اللقاح .
- الفريق الطبي سيقوم بتقديم النصائح الطبية المناسبة عند وجود مثل هذه العوارض .

6 - ما الآثار الجانبية للقاح إنفلونزا H1N1 ؟

أ - المتاعب الطفيفة :-

ألم أو احمرار في موضع الحقن - صداع وألم في العضلات ، حمى ، غثيان .
في حالة حدوث مثل هذه المتاعب فإنها تبدأ بعد أخذ الحقنة وتستمر لمدة تتراوح بين يوم إلى يومين .

ب - المتاعب الحادة :-

تفاعلات الحساسية المفرطة ضد اللقاحات نادرة للغاية وإذا حدثت ، فعادة ما تستمر لبضع دقائق حتى ساعات قليلة بعد الحقن .
في عام 1976 ، اقترن نوع سابق من لقاح حامل لإنفلونزا الخنازير بالإصابة بحالات متلازمة غيلان برييه GBS ومنذ ذلك الحين لم يقترن لقاح الإنفلونزا بالإصابة بمتلازمة غيلان برييه بشكل واضح .